




Carta geologica

- da Terreni di riporto antropico: terreni di bonifica, terreni di risulta derivanti da opere di escavazione e sbancamento. Materiale di riempimento di discariche.
- PSI1 Depositi piroclastici rimaneggiati: depositi eluvio-colluviali, costituiti da elementi juvenili e frammenti litici, talora organizzati in livelli e lenti, in matrice a granulometria fine a luoghi argillificata.
- PSI2 Depositi piroclastici rimaneggiati: depositi colluvio-alluvionali, costituiti da livelli e lenti, a granulometria variabile da fine a grossolana.
- Debris Depositi di versante: depositi caotici, a granulometria prevalentemente fine (Dra), presenza di blocchi e massi in corrispondenza dei versanti più acclivi impostati su rocce tufacee o laviche (DB).
- SP1 Spoglie attuali o recenti: sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi del sistema costiero-dunare, contenenti ciottoli lavici e tufalci arrotondati e appiattiti.

Età compresa tra 12.000 y. B.P. e 1538 d.C.

Prodotti dell'eruzione di Monte nuovo (1538 d.C.): deposito basale da flusso piroclastico da massivo a debolmente laminato costituito da pomice e scorie immerse in una matrice cineritica (MNA). A tutto si presenta un livello di scorie da caduta (MNB) e, a chiudere la sequenza sul fianco meridionale del cratere, un deposito grossolano da scoria flow.

Prodotti dell'attività flegrea recente: depositi piroclastici eterometrici sciolti geneticamente legati a dinamismi da caduta e da flusso piroclastico. I depositi PS assumono caratteri differenti: nelle aree prossimali, interne alla caldera flegrea, prevalgono depositi cineritici con stratificazione incrociata o piano-parallelata (PSa), nelle aree distali prevalgono livelli piroclastici ben selezionati costituiti da frammenti pomice di dimensioni centimetriche e litici di dimensioni millimetriche (PSb).

Tufi gialli dell'attività flegrea recente: depositi piroclastici da semi-coerenti (TFA) a coerenti (Tfb) a struttura massiva e/o stralide, costituiti da matrice cineritica giallastra nella quale sono immersi frammenti pomiceo e/o scoriale a luoghi fortemente alterati e litici di dimensioni variabili. Il complesso raggruppa i Tufi del Gauro, Archiavento, Capo Miseno, Punta Epitaffio, Nisida, La Pietra. Il Tufo del Gauro è a struttura stralide, molto selezionato e formato da piccole pomice grigio-chiare cui si associano frammenti di ossidiana in una matrice sottile. Il Tufo di Archiavento presenta anche essa struttura stralide e si caratterizza per una concentrazione di grosse pomice verso l'alto. I frammenti litici, omogeneamente diffusi come le pomice di dimensioni più piccole, sono rappresentati da xenoliti lavici e frammenti di tufo verde. Il Tufo di La Pietra, si presenta intensamente fratturato e dislocato, alla base contiene grosse scorie e frammenti litici.

Cupole laviche dell'attività flegrea recente: lave alcalitrahiche compatte della cupola lavica del Monte Olibano (LVR).

Vulco e della cupola lavica della Caprera (LVCo).

Depositi del terrazzo marino della Starza: successione di intervalli depositi in ambiente subaereo e subaqueo, il cui spessore totale è di circa 25 metri. I singoli intervalli di deposizione subaquea raggiungono uno spessore massimo di 10 metri (presso lo stabilimento SOFER) e sono rappresentati da cunei contenenti vari elementi pomice arrotondati e accumuli di pezzi di Gasteropodi e Lamellibranchi. Gli intervalli di deposizione subaerea sono rappresentati da depositi piroclastici eterometrici da grossolani a sabbioso-fini, con spessore di pochi metri.

Età compresa tra 37.000 y. B.P. e 12.000 y. B.P.

Formazione del Tufo Giallo Napoletano (TGN): deposito piroclastico rappresentato da una facies litode (TGNa) e da una facies incrociata (TGNb). Il deposito di colore giallo e grigio presenta una struttura da massiva a ondulata su grande scala, con matrice a granulometria da sabbioso-grossolana a fine contenente elementi pomiceo da centimetrici a decimetrici e frammenti di litici lavici e di tufo verde a luoghi arrotondati. Sia la frazione juvene della matrice che quella dei clasti pomiceo sono per lo più alterate per fenomeni di zeolitizzazione. La parte basale della formazione si presenta fittamente stratificata e contiene livelli pisolitici in cui si intercalano livelli di pomice da caduta. Lo spessore varia da pochi metri a un centinaio di metri (Soccavo-Napoli).

Depositi piroclastici dell'attività compresa tra l'IC e il TGN: depositi costituiti da flusso piroclastico (PFTa) - Tufi biancastri stratificati, Tufi Antichi della città di Napoli e Tufo Giallo di Soccavo) da incrociati a semi-coerenti a stratificazione incrociata con lamine a basso angolo. Nello stesso intervallo temporale in minor misura sono rappresentati depositi piroclastici da caduta (PFTb), come i banchi di scorie scure senza matrice della Formazione di Torre Gaveta.

Età compresa tra 37.000 y. B.P. circa

Piperno e depositi di breccia: il Piperno è costituito da un deposito da flusso piroclastico litode a tessitura eutassica ricco di scorie nere (PPa). Le breccie, associate al Piperno di Soccavo, e affioranti a Punta Marmolite e Monte di Procida costituiscono un deposito incrociato a granulometria grossolana e basso sorting formati in prevalenza di scorie e/o pomice grossolane e, in misura minore, frammenti di ossidiana e litici eterometrici ed eterogenei (PPb), all'interno delle breccie sono presenti orizzonti discontinui di scorie saldate.

Formazione dell'ignimbrite Campana (IC): deposito da flusso piroclastico rappresentato da una breccia poligenica con dimensioni medie dei blocchi lavici e delle scorie fino al metro di diametro (ICa), passante lateralmente o verticalmente ad una facies di colore giallo, a differente grado di litificazione con contenuto variabile in scorie grigio-scure di dimensioni da centimetriche a decimetriche poco colassate (ICb); in questa facies tufacea sono presenti strutture da degassazione (Porti Rossi-Napoli).


Piroclastiti antiche del settore continentale dei Campi Flegrei comprendono i Tufi di Torre Franco e la sequenza di Monte Grillo, e nella zona meridionale della Piana di Quarto, una sequenza di depositi piroclastici incrociati eterometrici separati da paleosuoli. I Tufi di Torre Franco (PA1) sono costituiti da un'alternanza di livelli di cenere a stratificazione incrociata e banchi di pomice e cenere da caduta, intercalati a paleosuoli; spessore inferiore a 50 m. La sequenza di Monte Grillo (PA2) rappresenta il relitto di una antica morfologia vulcanica ed è costituita da un'alternanza di livelli incrociati di scorie di dimensioni decimetriche e livelli cineritici per uno spessore massimo di 120 metri. La parte basale della successione è litode e di colore giallo.

Cupole laviche dell'attività flegrea antica: cupole laviche alcalitrahiche di Punta Marmolite, Cums, S.Martino (Monte di Procida).

Prodotti piroclastici dai centri eruttivi vari, costituiti da banchi pliniane, depositi di colata piroclastica e tufi intercalati a paleosuoli.

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania
Aggiornamento anno 2010

CARTA GEOLITOLICA



Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PA) è stato redatto alla scala 1:5000 su Cartografia Tecnica Regionale (ed. 2004 - 2005).

GRUPPO DI PROGETTO

Responsabili scientifici
prof. ing. Michele Di Natale (conv. 04/2007)
prof. geol. Roberto de Riso (conv. 03/2007)

Consulenza giuridica
avv. Angelo Marzocchella (Avvocata Regionale)

Coordinamento generale di progetto
arch. Paolo Tolentino

Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania

ing. Stefano Coraggio

ing. Luigi Iodice

ing. Pasquale Lavezza

arch. Pietro Paolo Picone

geol. Antonella Riccio

geol. Assunta Maria Santangelo

SUPPORTO SCIENTIFICO

CIRIAM - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Ingegneria Ambientale della Seconda Università degli Studi di Napoli (conv. 02/2007)

responsabili:
prof. ing. Corrado Gionni, prof. ing. Alessandro Mandolini

collaboratori convenzionati dal CIRIAM

ing. Agostino Santillo

ing. Luca Cristoforo

ing. Diego Di Martino

ing. Anna Di Mauro

arch. Valeriano Pesce

ing. Eleonora Quaranta

ing. Liberta Tufano

società convenzionate dal CIRIAM:

Tecnolievi s.r.l. per il rilievo topografico

Idrogeo s.r.l. per l'indagine geotecnica

DIGA - Dipartimento di Ingegneria Idraulica Geotecnica ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (conv. 01/2007)

responsabile prof. geol. Domenico Calcester

coordinatore prof. geol. Antonio Santo

collaboratori convenzionati dal DIGA

geol. Melania De Felco

geol. Sossio Del Prete

arch. Maria De Rosa

geol. Giuseppe Di Crescenzo

geol. Luca Di Iorio

geol. Vittorio Emanuele Iervolino


geol. Biagio Palma

geol. Marcello Ristella

IL SEGRETARIO GENERALE

dot. Giuseppe Catenacci

Sistema Informativo Territoriale: Proiezione UTM - Datum WGS 84 - Zona 32 N
Scale 1: 10.000
GL 447150



447102	447113	447112	447123
447141			447164
447142	447150		
465021	465034		

Schema N° 447150
Rilevato e elaborato nella proiezione UTM
Datum WGS 84 - Zona 32 N

CARTA GEOLITOLICA

Legenda

- Giacitura di strato
- Cava attiva
- Cava non attiva
- Duomo lavico
- Contatto stratigrafico (tratteggiato ove incerto)
- Faglia diretta (i trattini indicano la parte ribassata) e sua probabile prosecuzione
- Contatto tettonico generico e sua probabile prosecuzione
- Orto di versante legato a collasso vulcano tettonico
- Orto di cratere
- Orto di cratere presunto
- Conoide detritico-alluvionale poco o non reinnescita, la cui attività è fortemente ridotta dalla presenza di canali artificiali. La rappresentazione dei conoidi non indica il preciso rapporto stratigrafico con i terreni adiacenti.
- Limite amministrativo comunale
- Limite amministrativo provinciale
- Limite dell'Autorità di bacino